

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО РУБІЖНОЇ АТЕСТАЦІЇ
з дисципліни
«КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ»

Тести

1. Дитині 5р. виставлено діагноз – дифтерія. Лікар призначив введення протидифтерійної сироватки за методом Безредка. Яким шляхом вводиться пробна доза сироватки?

- A. Внутрішньошкірно
- B. Підшкірно
- C. Внутрішньом'язево
- D. Внутрішньовенно
- E. Інгаляційно

2. Дитині виповнилося 11 місяців. Медична сестра повинна запросити матір з дитиною для профщеплення проти кору, паротиту та краснухи, коли дитині виповниться:

- A. 12 місяців
- B. 18 місяців
- C. 1,5 року
- D. 20 місяців
- E. 2 роки

3. Дитина 3 років захворіла декілька годин тому. З'явилися загальна слабкість, підвищення температури тіла до 38,2°C, біль у надчеревній ділянці, нудота, блювання. Випорожнення надмірні, пінисті, містять велику кількість слизу, зелені. Яку з проблем слід очікувати протягом перших 3-ох діб:

- A. Токсикоз з ексикозом
- B. Інфекційно – токсичний шок
- C. Порушення функції підшлункової залози
- D. Анемія
- E. Гостра ниркова недостатність

4. До інфекційної лікарні поступила дитина 12 років. Скарги на біль в горлі під час ковтання, підвищення температури тіла. При огляді набряк мигдаликів і піднебінних дужок, гіперемія з ціанотичним відтінком. На поверхні мигдаликів фібринозний напіт білуватого кольору. Лікар запідозрив дифтерію ротоглотки. В план медсестринських втручань медична сестра включить:

- A. Ліжковий режим з повним фізичним та психічним спокоєм
- B. Загальний режим
- C. Напівліжковий режим
- D. Дієта №15
- E. Масаж, гімнастика

5. Дитині 14 років , хворіє на епідемічний паротит 5 добу. Вранці знову підвищилася температура тіла. Скарги на біль в ділянці калитки і яєчка, біль під час сечовипускання. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:

- A. Орхіт
- B. Гострий цистит
- C. Гострий пієлонефрит
- D. Гостра затримка сечі
- E. Гідронефроз

6. Медична сестра дитячого садочку помітила, що у дитини підвищилася температура тіла, на шкірі обличчя, тулуба з'явився висип у вигляді рожевих плям, які перетворюються на везикули. Які першочергові протиепідемічні заходи має здійснити медична сестра?

- A. Ізолювати дитину
- B. Госпіталізація до інфекційного відділення
- C. Залишити в групі до приходу матері
- D. Обробити висипи діамантовим зеленим
- E. Викликати швидку допомогу

7. Здоровій доношеній новонародженій дитині потрібно провести імунопрофілактику туберкульозу. Яку дозу препарату необхідно ввести дитині?

- A. 0,05 мг вакцини БЦЖ
- B. 0,1 мг вакцини БЦЖ
- C. 0,1 мл туберкуліну
- D. 0,5 мл туберкуліну
- E. 0,1 мг туберкуліну

8. Перед ревакцинацією БЦЖ в підготовчій групі дитячого садка зробили пробу Манту. У однієї дитини реакція виявлена гіперергічною. Тактика медичної сестри стосовно дитини з гіперергічною реакцією

- A. Направити дитину до фтізіопедіатра
- B. Зробити рентгенологічне обстеження
- C. Повторно ввести туберкулін
- D. Призначити загальний аналіз крові, сечі
- E. Провести хіміопротекцію

9. У дитини 5 років протягом 2-х тижнів спостерігається кашель, який посилюється вночі і не піддається симптоматичному лікуванню. Поступово кашель набув нападаподібного характеру з репризами. Лікарем діагностовано кашлюк. Яке обстеження доцільно ввести до плану медсестринських втручань?

- A. Бактеріологічне обстеження слизу із носової частини глотки
- B. Аналіз крові на біохімічне дослідження
- C. Загальний аналіз сечі
- D. Взяти змиви із носоглотки на вірусологічне дослідження

Е. Рентгенологічне обстеження

10. У дитини 5 років підвищена втомлюваність, пітливість, зниження апетиту, тривалий субфебрилітет. Шкіра бліда, лімфатичні вузли збільшені, м'якої консистенції, безболісні. У загальному аналізі крові лейкоцитоз, збільшення ШОЕ. В анамнезі – контакт з хворим на активну форму туберкульозу. При плануванні медсестринських втручань найбільш доцільним в обстеженні пацієнта буде:

- А. Проведення проби Манту
- В. Біохімічне дослідження крові
- С. Бактеріологічне дослідження мокротиння
- Д. Рентгенологічне обстеження органів грудної клітини
- Е. Бактеріологічне дослідження сечі

11. У дитини 5 років лікар діагностував кір. При плануванні медсестринських втручань необхідно передбачити:

- А. Догляд за слизовими оболонками носових ходів, очей, ротової порожнини
- В. Взяття мазків із зівів і носа
- С. Загальний аналіз крові, біохімічне дослідження крові
- Д. Загальний аналіз сечі
- Е. Кал на копрограму

12. Ви медсестра дитячого дошкільного закладу, в якому стався випадок захворювання дитини на скарлатину. Що необхідно включити медсестрі до плану профілактичних заходів після госпіталізації дитини?

- А. Карантин на контактних у групі на 7 днів з медсестринським спостереженням
- В. Проведення заключної дезінфекції
- С. Проведення специфічної профілактики вакциною
- Д. Введення контактним дітям імуноглобуліну
- Е. Ізоляція контактних дітей на дому

13. Дитина 10 років знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом “Кір”. На фоні проведеного догляду і терапії на 8 день від початку захворювання, на обличчі з'явилась світло-коричнева пігментація з незначним свербінням. Стан дитини задовільний, t-36,5оС, дихання везикулярне, ЧД – 20/хв. Чи є пігментація проявом неадекватного догляду за дитиною?

- А. Ні, пігментація - це прояв типового перебігу кору (II період)
- В. Так, пігментація - є ускладненням кору
- С. Так, пігментація - це алергічна реакція на ліки
- Д. Так, пігментація є проявом порушення гігієнічного режиму
- Е. Ні, пігментація - це прояв ексудативно-катарального діатезу

14. Дитині 3,5 місяці призначено проведення очисної клізми. Яку кількість рідини повинна набрати у гумовий балончик медична сестра?

- А. 50 мл.

- В. 10 мл.
- С. 30 мл.
- Д. 100 мл.
- Е. 150 мл.

15. Медична сестра повинна провести забір матеріалу з носоглотки на чашку Петрі для виявлення палички Борде-Жангу. При якому захворюванні проводиться таке дослідження?

- А. При кашлюку
- В. При туберкульозі
- С. При дифтерії
- Д. При менінгококовій інфекції
- Е. При скарлатині

16. Під час патронажу до дитини 2-х місяців медична сестра оглянула місце ведення БЦЖ-вакцини. Яка реакція на місці введення БЦЖ-вакцини вважається нормальною у дитини цього віку?

- А. Інфільтрат 5-10 мм з кірочкою у центрі
- В. Інфільтрат 10-15 мм
- С. Виразка 10 мм
- Д. Рожевий рубчик 4-6 мм
- Е. Деепітелізований рубчик

17. В ізоляторі дитячого будинку знаходиться дитина 3-х років з діагнозом “Вітряна віспа”. На який термін треба цю дитину ізолювати від колективу?

- А. 5 днів від останнього висипання
- В. 5 днів від початку захворювання
- С. 5 днів від початку появи висипання
- Д. 10 днів від початку захворювання
- Е. 22 дні від початку захворювання

18. В ізоляторі оздоровчого табору знаходиться дитина 12-и років з діагнозом “Фолікулярна ангіна”. Яке обстеження треба провести протягом 72-х годин від встановлення цього діагнозу?

- А. Мазок із зів та носа на бацилу Леффлера
- В. Мазок із зів на бактеріальну флору і чутливість до антибіотиків
- С. Змив із носоглотки на наявність вірусів
- Д. Загальний аналіз крові
- Е. Загальний аналіз сечі

19. В ізоляторі оздоровчого табору знаходиться дитина 10 років з діагнозом “Кишкова інфекція”. Яке обстеження треба провести протягом 72-х годин від встановлення цього діагнозу?

- А. Бактеріологічне дослідження калу
- В. Аналіз калу на яйця гельмінтів

- C. Зіскоб на ентеробіоз
- D. Колоноскопія
- E. Копрограма

20. Вакцинацію проти гепатиту В починають у віці:

- A. В 1-ий день життя
- B. 3 місяці
- C. 4 місяці
- D. На 3-4 добу
- E. 1 рік

21. Реализация плана сестринских вмешательств по уходу за кожей ребенка при ветряной оспе предусматривает:

- A. обработка элементов сыпи 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого
- B. элементы сыпи не обрабатывать
- C. элементы сыпи обрабатывать детским кремом
- D. вскрывать элементы сыпи
- E. элементы сыпи обрабатывать 3% раствором перекиси водорода

22. В средней группе детского сада выявлен случай коклюша. Какие мероприятия должна провести медсестра в очаге инфекции?

- A. установит карантин на 14 дней. Выявить контактных и организовать наблюдение
- B. установит карантин на 30 дней. Выявить контактных
- C. карантин не устанавливать
- D. всех контактных обследовать на ВЛ
- E. установит карантин на 21 день

23. Дитині 5 років. Скарги на біль у горлі під час ковтання, припухлість шиї, підвищення температури тіла до 39°C. Хворіє три доби. Під час огляду: стан дитини тяжкий, шкіра бліда. Мигдалики майже зникаються, вкриті сіруватим нальотом. На шиї у ділянці нижньої щелепи - м'яка неболюча припухлість, яка спускається до ключиці. Ці симптоми характерні для:

- A. Токсична форма дифтерії зіву II ступеня
- B. Дифтерія гортані
- C. Інфекційний моноклеоз
- D. Токсична форма дифтерії зіву III ст.
- E. Пара тонзиліт

24. Дитині 5 років. При огляді на долонях спостерігається пластинчате лущення. Для якого захворювання характерні такі симптоми:

- A. Скарлатина
- B. Вітряна віспа
- C. Краснуха

- D. Кір
- E. Паротитна інфекція

25. Специфічна профілактика туберкульозу включає:

- A. Введення вакцини БЦЖ
- B. Введення туберкуліну
- C. Введення вакцини АКДП
- D. Проведення заключної дезінфекції
- E. Спостереження за контактними

26. Дитина 6 років хворіє на кір. Вкажіть ускладнення, які найчастіше трапляються при кору:

- A. Пневмонія
- B. Орхіт
- C. Ангіна
- D. Міокардит
- E. Ураження печінки

27. При огляді дитини 4 років на шкірі тулуба, обличчя виявили папули, везикули, рожеві плями. Для якого захворювання характерна наявність цих елементів:

- A. Вітряна віспа
- B. Кір
- C. Краснуха
- D. Менінгококова інфекція
- E. Скарлатина

28. У дитини захворювання почалося гостро з підвищення температури тіла та появи набрякув ділянці привушної слинної залози з однієї сторони. Ці симптоми вказують на:

- A. Паротитну інфекцію
- B. Скарлатину
- C. Менінгококову інфекцію
- D. Дифтерію
- E. Кір

29. Визначить першочергові дії у разі харчової токсикоінфекції у дітей на догоспітальному етапі:

- A. Промити шлунок та кишечник
- B. Напоїти гарячим чаєм
- C. Розпочати дезінтоксикаційну терапію
- D. Призначити послаблювальні препарати
- E. Зробити очисну клізму

30. Ви - медсестра кабінету профщеплень дитячої поліклініки плануєте свою роботу, складаєте план профілактичних щеплень. Яким має бути інтервал між проведенням проби Манту і вакцинацією БЦЖ?

- A. Не менше 3 днів і не більше 2 тижнів
- B. 2 дні
- C. Не менше 1 і не більше 2 місяців
- D. 21 день
- E. 2 місяці

31. Після огляду здорової новонародженої дитини першого дня життя лікар призначив проведення щеплення проти гепатиту В. Мама дитини поцікавилась, які ще щеплення проводять новонародженим у пологовому будинку?

- A. БЦЖ на 3-5-й день
- B. Проти кору, краснухи на 3-й день.
- C. Проти поліомієліту на 3-й день
- D. Проти дифтерії на 2-й день
- E. Проти епідемічного паротиту в 1-й день

32. Визначить строк I ревакцинації проти туберкульозу.

- A. 7 років
- B. 5 років
- C. 10 років
- D. 12 років
- E. 14 років

33. Назвіть термін проведення II ревакцинації поліомієлітною вакциною.

- A. 3 роки
- B. 6 років
- C. 18 міс.
- D. 14 років
- E. 8 міс.

34. При огляді дитини 1,5 місяців медсестра оцінює стан шкіри лівого плеча. Яка місцева специфічна реакція з'являється на місці введення БЦЖ у первинно вакцинованих дітей через 4 -6 тижнів?

- A. Інфільтрат
- B. Пустула
- C. Папула
- D. Виразка
- E. Рубчик

35. У дитини напади кашлю складаються з серії видихальних кашльових поштовхів, відокремлених репризами, які повторюються до 10 разів на добу. Для якої хвороби характерні ці прояви?

- A. Кашлюк
- B. Ларингіт
- C. Напад бронхіальної астми.

- D. Кір.
- E. Пневмонія

36. Медична сестра доглядає дитину, хвору на краснуху. Вкажіть максимальний інкубаційний період.

- A. 21 день
- B. 14 днів
- C. 7 днів
- D. 2 дні
- E. 5 днів

37. Який характерний симптом спостерігають на 3 – ій день висипання у разі захворювання на вітряну віспу?

- A. Поліморфізм висипу.
- B. Плями Бельського-Філатова-Копліка.
- C. Симптом Філатова.
- D. Палаючий зів
- E. Афонія голосу.

38. При обстеженні в дівчинки 9 років спостерігаються: головний біль, біль у горлі під час ковтання, $t^{\circ} - 38,60C$. На шкірі дрібнокраплинний, яскраво-рожевий висип на гіперемійованому тлі шкіри, крім носо-губного трикутника; язик яскраво-червоний, сосочки гіпертрофовані. Слизові оболонки передніх піднебінних дужок м'якого піднебіння, язичка яскраво гіперемійовані. Вкажіть найхарактернішу наявну проблему пацієнта, яка буде виявлена з боку шкіри при обстеженні через тиждень від появи шкірних симптомів.

- A. Лущення
- B. Пігментація
- C. Висип
- D. Везикули
- E. Плями.

39. Під час ранкового огляду дітей у дитячому садочку медична сестра помітила в 4 річної дівчинки на шкірі обличчя, на волосяній частині голови плями, дрібні папули та везикули. Везикули мають овальну форму, розміщені на неінфільтрованій основі. Навколо везикули є вузька смужка гіперемії. Визначте наступний елемент висипу, який буде виявлений при обстеженні.

- A. Кірочки
- B. Горбики
- C. Лущення
- D. Вузлики
- E. Пустули.

40. Дитина народжена ВІЛ – інфікованою матір'ю, ВІЛ – статус дитини не визначено. Медична сестра планує проведення специфічної профілактики проти інфекційних захворювань до уточнення ВІЛ – статусу. Вкажіть вакцину, яку можна планувати вводити даній дитині.

- A. АКДП
- B. БЦЖ
- C. Корову
- D. Паротитну
- E. Поліомієлітну оральну

41. Дитина 6 місяців, яка народилася від II вагітності, фізіологічних пологів, з масою тіла 2800 г., з ростом 46 см., знаходиться на природному вигодовуванні; має 2 нижні медіальні різці, готується до вакцинації, знаходиться на прийомі в дитячій поліклініці. Вкажіть найінформативніше обстеження для оцінки фізичного розвитку дитини.

- A. Виміряти зріст дитини
- B. Підрахувати частоту пульсу
- C. Виміряти артеріальний тиск
- D. Підрахувати кількість дихальних рухів
- E. Виміряти температуру тіла.

42. У дитини 4-х років з'явилися лихоманка до 39°C, пронос, повторне блювання, головний біль, сонливість, анорексія. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмо видна кишка палькується у вигляді тонкого тяжа. Про яке захворювання можна думати?

- A. Дизентерія
- B. Сальмонельоз
- C. Ешерихіоз
- D. Токсична диспепсія
- E. Холера

42. Вкажіть номер наказу МОЗ України, який регламентує календар щеплень дітей:

- A. № 48
- B. № 152
- C. № 120
- D. № 318
- E. № 434

43. Визначте вік дітей, підлеглих ревакцинації проти кору, паротиту, краснухи

- A. 6 років
- B. 7 років
- C. 14 років

D. 15 років

E. 18 років

44. Дитина 4-х років хворіє другий день. Хвороба розпочалась гостро з підвищення температури тіла до 38°C. Скаржиться на біль у горлі, зниження апетиту, порушення сну. Об'єктивно: гіпертрофія мигдаликів, гній в лакунах, язик з сіруватим нальотом. На помірногіперемованій шкірі дрібно крапкова яскраво червона висипка, яка згущується в природніх складках, носогубний трикутник блідий. Про яке захворювання має подумати медична сестра?

A. Скарлатина

B. Вітряна віспа

C. Краснуха

D. Кір

E. Менінгококова інфекція

45. Дитині 18 міс., зроблено щеплення вакциною АКДП. Через 20 хв. стан різко погіршився. На шкірі тулуба з'явився висип дитина знепритомніла. Які лікарські препарати потрібно приготувати негайно?

A. 0,1% розчин адреналіну

B. 1% розчин лазіксу

C. 0,06% розчин корглікону

D. 2% розчин еуфіліну

E. 0,5% розчин седуксену

46. В інфекційному відділенні знаходиться дитина з діагнозом ГРВІ. Гіпертермічний синдром. При обстеженні виявлено: t° 39,4°C, шкіра бліда, мрамурова, кінцівки холодні на дотик. Який препарат потрібно ввести дитині за призначенням лікаря для зменшення спазму судин:

A. Папаверину гідрохлорид

B. Седуксен

C. Супрастин

D. Магнію сульфат

E. Глюконат кальцію

47. Медсестра оглянула дитину 4-х років на 3-й день захворювання. Діагноз, встановлений лікарем: ГРВІ, кір? Який симптом може підтвердити діагноз кору.

A. дрібні білі плями на слизовій щік

B. свербіж шкіри

C. збільшення задньошийних лімфовузлів

D. плівки на мигдаликах

E. везикульозний висип на шкірі

48. Дитина 10 міс. госпіталізована в інфекційне відділення з Ds: менінгококцемія. На який висип, що підтвердить діагноз, зверне увагу медсестра при догляді за дитиною?

- A. Геморагічний
- B. Везикульозний
- C. Папульозний
- D. Плямисто-папульозний
- E. Розеольозний

49. Медсестра оглядає хлопчика 5 років. Під час огляду дитина закашлялась. Кашель нападає з глибоким свистячим вдихом, закінчився відходженням в'язкого мокротиння і блюванням. Про яке захворювання може подумати медсестра?

- A. Кашлюк
- B. Парагрип
- C. Бронхіт
- D. Ларинготрахеїт
- E. Пневмонія

50. У дитини 7 років, яка хворіє на епід. паротит, на 6-й день захворювання підвищилась температура тіла до 39°C, з'явився переймоподібний, оперізувальний біль в животі, нудота, повторне блювання. Ураження якої ендокринної залози може запідозрити медсестра?

- A. Підшлункової
- B. Надниркової
- C. Щитоподібної
- D. Загрудинної
- E. Статевої

51. Дитині 8 років. Скаржиться на млявість, незначний нежить та кашель. Загальний стан не порушений. Під час огляду звертає на себе увагу дрібноплямиста висипка на чистому тлі шкіри, переважно на розгинальних поверхнях кінцівок, на спині, сідницях. Збільшення потиличних, завушних і задньошийних лімфовузлів, які ущільнені та болючі при пальпації. Яке захворювання можна запідозрити?

- A. Краснуха
- B. Кір
- C. Скарлатина
- D. Геморагічний васкуліт
- E. Атопічний дерматит

52. У дитини віком 6-ти років при огляді шкіри медична сестра виявила папули та однокамерні везикули по всьому тілі, включаючи волосисту частину голови. Вкажіть який медичний препарат для обробки елементів висипки з метою попередження їх інфікування повинна застосувати медична сестра?

- A. 1% спиртовий розчин діамантового зеленого
- B. 30% розчин сульфацилу натрію
- C. 1% розчин дімедролу
- D. 50% розчин анальгіну
- E. 5% розчин йоду

53. В пологовому будинку після огляду лікарем новонародженої дитини віком 3 дні заплановано щеплення проти туберкульозу. Яким способом медсестра введе вакцину БЦЖ?

- A. Внутрішньошкірно
- B. Внутрішньом'язово
- C. Внутрішньовенно
- D. Підшкірно
- E. Через рот

54. Дітей якого віку дільнична медсестра запланує на проведення I вакцинації проти поліомієліту?

- A. 3 міс.
- B. 4 міс.
- C. 5 міс.
- D. 6 міс.
- E. 7 міс.

55. Медсестра дитячої дошкільної установи планує проведення діагностичної проби Манту. Яким препаратом вона буде виконувати дану маніпуляцію?

- A. Туберкуліном
- B. Гістаглобуліном
- C. Дизентериком
- D. Вакциною БЦЖ
- E. Вакциною КПК

56. В інфекційному відділенні на лікуванні перебуває дитина першого року життя, хвора на кашлюк. Яку проблему, як основну, виділить медсестра?

- A. Спазматичний нападоподібний кашель
- B. Нежить
- C. Блювання
- D. Гарячка
- E. Самовільне сечовипускання

57. Дільнична медсестра навчає матір дитини 7 років, хворої на кір, догляду – промиванню очей. Який розчин вона рекомендує використовувати?

- A. р-н фурациліну 1:5000
- B. 30% р-н сульфацил-натрію
- C. 0,1% р-н формаліну
- D. р-н димексиду
- E. 0,5% р-н глюкози

58. Який діагноз поставить медсестра при обстеженні дитини, хворої на епідемічний паротит?

- A. Припухлість та болісність привушних слинних залоз
- B. Нежить
- C. Кашель
- D. Висипка
- E. Судоми

59. Яку висипку виявить медсестра під час обстеження дитини 6 років, хворої на скарлатину?

- A. Дрібну на гіперемованій шкірі
- B. Зіркоподібну геморагічну
- C. Плямисто-папульозну
- D. Плямисто-папульозно-везикульозну
- E. Пустульозну

60. Реалізуючи план втручань, медсестра допомагає дитині 10 років, хворій на вірусний гепатит А, в дієтичному харчуванні. Які страви необхідно виключити з раціону?

- A. Смажені страви
- B. Знежирений сир
- C. Парові котлети
- D. Кисломолочні продукти
- E. Кисіль

61. Дитина 1-го року життя перебуває в інфекційному відділенні на лікуванні з приводу коліінфекції. Які випорожнення характерні для даного захворювання?

- A. Водянисті оранжевого кольору
- B. Пінисті темно-зеленого кольору
- C. У вигляді „січеного яйця”
- D. Кров'янисто-слизові
- E. У вигляді рисового відвару

62. Реалізуючи план втручань, медсестра здійснює систематичний контроль за випорожненнями дитини 8 років, хворої на сальмонельоз. Які показники вона повинна відмітити в листі спостережень?

- A. Наявність патологічних домішок в калі
- B. Частоту сечовипускань
- C. Колір сечі
- D. Консистенцію сечі
- E. Наявність патологічних домішок с сечі

63. Дитина 3 років перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні з приводу дизентерії. Яку найбільш типову ознаку виявить медсестра при обстеженні хворого?

- A. Тенезми
- B. Блідість шкіри
- C. Сухість слизових оболонок

- D. Відсутність апетиту
- E. Нудоту

64. В якому віці і якому контингенту дітей проводиться друга ревакцинація проти краснухи.

- A. В 15 років дівчатам
- B. В 1 рік всім дітям
- C. В 6 років всім дітям
- D. В 7 років всім дітям
- E. В 15 років хлопцям

65. Яка вага при народженні є протипоказом для введення вакцини БЦЖ на 3 добу життя дитини.

- A. до 2000 г
- B. 2300
- C. 2500
- D. 3000
- E. 3500

66. Які вакцини не можна вводити ВІЛ – інфікованій дитині

- A. Проти туберкульозу
- B. Проти гемофільної інфекції
- C. Проти поліомієліту інактивовану
- D. Проти гепатиту В
- E. Проти дифтерії, кашлюку, правця

67. Які медсестринські втручання доцільні при захворюванні на вітряну віспу

- A. Проводити обробку везикул 1% розчином діамантового зеленого
- B. Прикладати сухе тепло на ділянку привушних залоз
- C. Забезпечити палату затемненням при світлобоязні
- D. Спостереження за кількістю та характером випорожнень
- E. Проведення промивання шлунку

68. Ви медсестра дитячого дошкільного закладу. У 4 річної дитини виявили блідо-рожеве висипання по всьому тілі, збільшення потиличних, задньошийних лімфовузлів. Яке медсестринське втручання найбільш доцільне в першу чергу:

- A. Ізоляція дитини
- B. Виміряти температуру тіла
- C. Обробити висип діамантового зеленого
- D. Взяти мазок із зів та носа
- E. Підрахувати дихання

69. Дитині 7 років. Щеплення не проводились. В класі є випадки кору. Які характерні симптоми може виявити медсестра в продромальному періоді?

- A. Плями Бельського-Філатова-Копліка

- В. Плямисто-папульозне висипання
- С. Пігментація висипань
- Д. Дрібнокрапкове висипання
- Е. Плямисто-папульозне-везикульозне висипання

70. Дитині 6 місяців. Госпіталізована в інфекційне відділення Скарги: випорожнення рідкі-15 разів на добу, блювання - 3 рази на добу. Шкіра, слизові оболонки сухі, бліді. Знижений тургор, еластичність шкіри, тім'ячко запале. У випорожненнях слизь, прожилки крові, втрата маси тіла 500 г. Поставте медсестринський діагноз?

- А. Ексикоз
- В. Перегодовування
- С. Порушення трофіки шкіри
- Д. Зменшення маси тіла
- Е. Знижена толерантність до їжі

71. Хлопчику 12 років. Скарги на підвищену втомлюваність, пітливість, погіршення апетиту, пам'яті, $t - 37,3^{\circ}\text{C}$. Результати проби Манту - 6 мм. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- А. Рання туберкульозна інтоксикація
- В. Хронічна туберкульозна інтоксикація
- С. Первинний туберкульозний комплекс
- Д. Туберкульоз внутрішньо грудних лімфовузлів
- Е. Вогнищевий туберкульоз легень

72. Дитині 5 років. Лікується з приводу паротитної інфекції. Скарги на підвищення $t - 37,2^{\circ}\text{C}$, біль в привушній ділянці при відкриванні рота, жуванні. Яке медсестринське втручання найбільш доцільне?

- А. Сухе тепло на ділянку привушних залоз
- В. Напівспиртовий компрес
- С. Прикласти міхур з льодом на ділянку привушних залоз
- Д. Холод на магістральні судини
- Е. Накласти гірчичники

73. На прийом в дитячу поліклініку прийшла дівчинка 15 років. Всі щеплення їй проведено згідно Наказу МОЗ України №48. Профілактику якого захворювання здійснить медсестра в цьому віці?

- А. Краснухи
- В. Кору
- С. Дифтерії
- Д. Паротиту
- Е. Поліомієліту

74. Дитині 3 місяці. Проведено щеплення проти дифтерії, кашлюку, правця. Профілактику якого захворювання повинна була запланувати медсестра в цьому віці?

- A. Поліомієліту
- B. Кору
- C. Краснухи
- D. Гепатиту В
- E. Паротитної інфекції

75. При відвідуванні хворої дитини 3-х років медсестра виявила, що температура тіла 38,3оС, геморагічний висип з елементами зіркоподібної форми на тілі, блювота, ригідність м'язів потилиці. Яке захворювання можна запідозрити?

- A. Менінгококцемію
- B. Геморагічний васкуліт
- C. Тромбоцитопенічну пурпуру
- D. Туберкульозний менінгіт
- E. Гострий лейкоз

76. Ви – дільнична медсестра, прийшли на активний патронаж до новонародженої дитини 10 днів. На шкірі з'явилась пітниця. Які симптоми на це вкажуть?

- A. Дрібні, червоного кольору висипи на обличчі та грудях
- B. Блідість шкіри
- C. Акроціаноз
- D. Гіперемія в складках
- E. Затруднене носове дихання

77. У дитини захворювання почалося гостро з підвищення температури тіла та появи набряку в ділянці привушної слинної залози з однієї сторони. Ці симптоми вказують на:

- A. Паротитну інфекцію.
- B. Кір.
- C. Дифтерію.
- D. Скарлатину.
- E. Менінгококову інфекцію.

78. Медична сестра у школі провела пробу Манту. Через який проміжок часу необхідно оцінити її результати у дітей?

- A. 72 год.
- B. 24 год.
- C. 1 год.
- D. 48 год.
- E. 20-30 хв.

79. Дільнична медсестра навчає матір дитини 7-ми років, що хвора на кір, догляду – промиванню очей. Який розчин вона рекомендує використовувати?

- A. Розчин фурациліну 1:5000.
- B. Розчин димексиду.
- C. 0,5% розчин глюкози.
- D. 0,1% розчин формаліну.
- E. 30% розчин сульфацил-натрію

80. В приймальне відділення надійшла дитина 5 років з харчовим отруєнням. З чого слід почати надання невідкладної допомоги?

- A. Промивання шлунка
- B. Введення жарознижуючих препаратів
- C. Введення глюкозо-сольових розчинів в\в краплинно
- D. Введення десенсибілізуючих препаратів
- E. Постановка очисної клізми

81. Вкажіть термін карантину в разі дифтерії:

- A. 7 днів.
- B. 22 дні.
- C. 5 днів.
- D. 9 днів.
- E. 25 днів.

82. На диспансерному обліку дитина 1-го року, які народилась з пологовою травмою ЦНС I-II ст. Вакцинація БЦЖ не проводилась. Що медсестра повинна внести в план своїх втручань з приводу підготовки пацієнта до проведення вакцинації БЦЖ?

- A. Проведення проби Манту і оцінка її результату.
- B. Проведення термометрії ранком і ввечері протягом тижня.
- C. Підготовка дитини до рентгенографії органів грудної клітки
- D. Контрольний огляд невропатологом.

83. Мати із здоровою дитиною 4-х місяців після огляду дільничним педіатром прийшла в кабінет щеплень на планове щеплення. Проти яких інфекцій медична сестра буде робити профілактичні щеплення дитині?

- A. Дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція
- B. Дифтерія, гепатит В, туберкульоз, поліомієліт, геміфільна інфекція
- C. Паротит, кір, поліомієліт, гемофільна інфекція, туберкульоз
- D. Дифтерія, кашлюк, правець, кір, краснуха
- E. Правець, поліомієліт, краснуха, паротит, кір.

84. Хлопчик 9-ти років звернувся до медичної сестри школи зі скаргами на біль у ділянці шиї, що посилюється при жуванні та ковтанні. Об'єктивно: температура тіла 37,7 С, спостерігається припухлість ямки між гілками нижньої щелепи та соскоподібним відростком з обох сторін, шкіра незмінена, напружена, блискуча. Яку пріоритетну проблему повинна вирішити медична сестра?

- A. Ізоляція хворої дитини

- В. Ввести знеболюючі препарати
- С. Повідомити лікаря
- Д. Накласти зігрівальний компрес на шию
- Е. Дати дитині жарознижуючі середники.

85. Під час огляду зіву у дитини 12-ти років медсестра звернула увагу, що мигдалики гіперемовані, навколо лікун білуватий наліт, який легко знімається ватним тампоном. З яким захворюванням треба провести диференційну діагностику?

- А. Дифтерія
- В. Краснуха
- С. Бронхіт
- Д. Хронічний тонзиліт
- Е. ГРВІ.

86. У дитини 5-ти років температура 38 С, з'явився висип на голові, тулубі, кінцівках у вигляді плям, папул, везикул без певної локалізації. Дані проблеми характерні для такого захворювання:

- А. Вітряна віспа
- В. Скарлатина
- С. Кір
- Д. Менінгококцемія
- Е. Краснуха.