

Тести

1. Первинна профілактика — це:

- а) комплекс заходів щодо запобігання виникненню захворювань;
- б) заходи щодо запобігання загостренням хронічних захворювань;
- в) активний метод динамічного спостереження різних категорій пацієнтів;
- г) усе перераховане правильно;
- г) усе неправильно.

2. Диспансеризація — це:

- а) комплекс заходів щодо запобігання виникненню захворювань;
- б) заходи щодо запобігання загостренням хронічних захворювань;
- в) активний метод динамічного спостереження різних категорій пацієнтів;
- г) усе перераховане правильно;
- г) усе неправильно.

3. Мамографію призначають усім жінкам віком понад:

- а) 16 років;
- б) 20 років;
- в) 25 років;
- г) 35 років;
- г) 45 років.

4. За підозри на пухлину шлунка необхідно призначити:

- а) рентгеноскопію шлунка;
- б) фіброгастроскопію;
- в) колоноскопію;
- г) іригоскопію;
- г) шлункове зондування.

5. Самообстеження грудних залоз необхідно проводити:

- а) 1 раз на 1 міс;
- б) 1 раз на 3 міс;
- в) 1 раз на півроку;
- г) 1 раз на 2 роки;
- г) щодня.

6. Підготовка хворого до фіброгастроскопії включає:

- а) промивання шлунка;
- б) очисну клізму;
- в) прихід зранку натще;
- г) усе, перелічене вище;
- г) усе неправильно.

7. Для збирання мокротиння хворого на туберкульоз кишенькову плювальницю заповнюють на одну чверть:

- а) 1 % розчином хлораміну;
- б) 3 % розчином хлораміну;
- в) 5 % розчином хлораміну;
- г) сухим хлорним вапном;
- г) перевареною водою.

8. Пробу Манту оцінюють через:

- а) 20—30 хв;
- б) 1 год;
- в) 24 год;
- г) 48 год;
- г) 72 год.

9. Пробу Манту (папулу 6 мм) вважають:

- а) негативною;
- б) сумнівною;

- в) позитивною;
- г) гіперергічною.

10. Специфічна профілактика туберкульозу включає:

- а) проведення проби Манту;
- б) вакцинацію і ревакцинацію БЦЖ;
- в) санітарно-просвітню роботу в осередку туберкульозу;
- г) подвірні обходи;
- я) флюорографічне обстеження населення.

Ситуаційні задачі

1. До сімейної медсестри за порадою звернулася жінка С., 50 років. Її чоловік перебуває на лікуванні в протитуберкульозному диспансері, є активним бактеріовиділювачем. Дочка повинна виписатися з пологового будинку, де народила доношеного здорового хлопчика масою тіла 3700 г. У жінки виникли питання: чи можна маляті провести щеплення вакциною БЦЖ? Чи може народжений онук контактувати з дідом?

2. Сімейний лікар після проведення клінічного обстеження й оцінювання результатів додаткових методів обстеження діагностував у хворого виразкову хворобу шлунка. Після цього дав завдання сімейній медсестрі заповнити документи на диспансерного хворого. Які дії сімейної медсестри?